

DAME

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: BORNEO 11 SC)
etoxazole (ετοξαζόλ) 11% • Υγρό Γαλακτωματοποίηση (EC)

Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των ωών και των άλλων ατελών σταδίων των ακάρεων. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση τετρανύχων σε μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιπφρουτ και φράπτα), τομάτα και μελιτζάνα υπαίθρου και θερμοκηπίου καθώς και σε βαμβάκι.

Πολύ σημαντικό όπλο για τον παραγωγό, καθώς συντελεί στη μείωση του πληθυσμού των ακμαιών, δρώντας σε προγενέστερα στάδια αυτών.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις, κηπευτικές και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο.

Δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε τομάτα και μελιτζάνα.

Συσκευασίες:

Φιάλες HDPE μεγέθους 25, κ.εκ. έως 1 λίτρου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



45

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

DAME

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής*-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά): Για Τετράνυχους: Κίτρινος (*Tetranychus urticae*), Κόκκινος (*Panonychus ulmi*) με i) 25-30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) με i) 25-30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.

Μικρής σημασίας χρήση: Δαμασκηλιά (PRNDO): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae* TETRUR, *Panonychus ulmi* METTUL) με 40-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.

Μικρής σημασίας χρήση: Κερασιά (PRNAV): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae* TETRUR, *Panonychus ulmi* METTUL) με 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-140 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούμενων μορφών από τα χειμερινά αυγά.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιπ φρουτ, φράπα): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*) με i) 15ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 200-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 20ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 200-250 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, iii) 25ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) με i) 25ml/100 λίτρα

ψεκ. υγρού* ή 25ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 30-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 25ml (max) σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Τέλος Άνοιξης-μέσα Ιουνίου με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) με i) 25-35ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα (υπαίθρου), ii) 25-30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα (θερμοκηπίου), iii) 35ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Καρπούζι, Πεπόνι (Υπαίθρου): Για κοινό Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) με 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 30-35ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Φράουλα υπαίθρου και υπό κάλυψη: Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) με 50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 40-50ml (max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Βαμβάκι: Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) με 30-37,5 (max) σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγμα των καρυδιών, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

Τριανταφυλλιά (θερμοκήπιο): Για κοινό Τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) με 25-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσμο φυλλώματος πλήρους κάλυψης, με την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων μορφών.

*Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού.

**Σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις των τοπικών γραφείων φυτοπροστασίας. Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και είναι παρών μεγάλος αριθμός ενηλίκων πρέπει να εφαρμοστεί ακαρεοκτόνο με δράση σε ενήλικα.

Διάρκεια προστασίας: 45-60 ημέρες.



46

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —