



ΣΑΣΑΡΑ

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: ZOXIS 250 SC)
Azoxystrobin 25% β/ο • Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση σε εύρος μυκητολογικών ασθενειών. Μετά την εφαρμογή απορροφάται μερικώς και μεταφέρεται διασυστηματικά στα φύλλα. Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

Ευρύ φάσμα δράσης.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο, όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.

Σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος αναφοράς, δεν φέρει σήμανση τοξικότητας για τις μέλισσες ή κάποια φράση προφύλαξης για αυτές.

Δεν απαιτείται τήρηση αφέκαστης ζώνης ασφαλείας για την προστασία μη στοχευμένων αρθροπόδων.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε Αγγούρι (Υ/Θ), Πεπόνι (Υ/Θ), Πιπεριά (Υ/Θ), Τομάτα (Θ), Φράουλα (Υ), Κολοκύθι (Υ/Θ), Καρπούζι (Υ/Θ), Μελιτζάνα (Θ).

Συσκευασίες:

- 1. Φιάλη 80, 100, 160, 200, 400, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρο PET, HDPE.
- 2. Δοχείο 5 λίτρα PET. 3. Δοχείο 5, 10, 20 λίτρα HDPE.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΑΟΚ.

Η εταιρία **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ** εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015



95

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

ΖΑΣΑΡΑ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: **Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο):** Για Ωίδιο και Περονόσπορο με 65-150⁽¹⁾ κ.εκ. ή 85-200⁽²⁾ κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75⁽¹⁾ κ.εκ. ή 100⁽¹⁾ κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες από την εμφάνιση του τρίτου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης (οι καρποί αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) (BBCH 13-81). **Αγγούρι (Υ, Θ), Πεπόνι (Υ, Θ):** Για i) Ωίδιο με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Περονόσπορο με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Τομάτα (Θ):** Για i) Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Αλτερνάρια, Περονόσπορο με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Πιπεριά (Υ, Θ):** Για Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Κολοκύθι (Υ, Θ):** Για Ωίδιο με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Καρπούζι (Υ, Θ):** Για Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Σπαράγγι:** Για Σκωρίαση, Στεμφύλιο με 80 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 41-89). **Φράουλα (Υ):** Για Ωίδιο με 80 κ.εκ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα (BBCH 51-89). **Καρότο:** Για Ωίδιο, Αλτερνάρια με 80-100 κ.εκ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από

την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 16-49). **Αγκινάρα:** Για Ωίδιο με 80 κ.εκ. σε 50-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 15-55). **Κρεμμύδι:** Για Περονόσπορο με 80 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου έως το στάδιο που το 50% των φυτών έχουν πλαγιασει (BBCH 14-48). **Σκόρδο:** Για Σκωρίαση με 80 κ.εκ. σε 20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου έως το στάδιο που το 50% των φυτών έχουν πλαγιασει (BBCH 14-48). **Μελιτζάνα⁽⁴⁾ (Θ) (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας):** Για i) Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Αλτερνάρια, Περονόσπορο με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). **Φιστικιά⁽⁴⁾ (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας):** Για Βοτρουοσφαίρια με 90 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί ανά 14-21 ημέρες από το τέλος της άνθησης/την εμφάνιση του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 69-85).

Παρατηρήσεις: **1.** Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα (75 κ.εκ. σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). **2.** Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). **3.** Η δόση είναι ανάλογη με την πίεση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. **4.** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της μελιτζάνας (Θ) και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

96

05/2020



www.nitrofarm.gr



info@nitrofarm.gr



Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7,



ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20,
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

NitroFarm

— από το 1976 —

